INTEGRALES DE SUPERFICIE DE F. ESCALARES

Supongamos que S es una superficie definida por la parametrización

$$\begin{aligned}\bar{T} &: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S \subset \mathbb{R}^3 \\ \bar{T}(u, v) &= x(u, v)\bar{i} + y(u, v)\bar{j} + z(u, v)\bar{k}\end{aligned}$$

donde los parámetros son u y v . Tomemos como hipótesis que x, y, z y sus derivadas parciales respecto de u y v están definidas y son continuas en una región D del plano uv . Las derivadas parciales de $\bar{T}(u, v)$ están dadas por

$$\bar{T}_u = \frac{\partial \bar{T}}{\partial u} = \frac{\partial x}{\partial u}\bar{i} + \frac{\partial y}{\partial u}\bar{j} + \frac{\partial z}{\partial u}\bar{k}, \quad \bar{T}_v = \frac{\partial \bar{T}}{\partial v} = \frac{\partial x}{\partial v}\bar{i} + \frac{\partial y}{\partial v}\bar{j} + \frac{\partial z}{\partial v}\bar{k}$$

Integral de superficie de funciones escalares

Sea $f(x, y, z)$ una función continua con valores reales definida en S . Definimos la integral de f sobre S como

$$\begin{aligned}\iint_S f(x, y, z) dS &= \iint_S f dS = \iint_D f(\bar{T}(u, v)) \|\bar{T}_u \times \bar{T}_v\| du dv \\ &= \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \|\bar{T}_u \times \bar{T}_v\| du dv\end{aligned}$$

INTEGRALES DE SUPERFICIE DE F. ESCALARES

Caso particular: Coordenadas cartesianas

Ahora supongamos que S es la gráfica de una función C^1 , $z = g(x, y)$. Si utilizamos x e y como parámetros, se puede ver fácilmente que:

$$\bar{T}_x \times \bar{T}_y = -(\partial g / \partial x) \bar{i} - (\partial g / \partial y) \bar{j} + \bar{k}$$

y, por tanto, el módulo de la normal (en cualquiera de las dos orientaciones) es en este caso es

$$\|\bar{T}_x \times \bar{T}_y\| = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2}$$

por lo que

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, g(x, y)) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

La integral doble está extendida a la región D , que es la proyección sobre el plano xy de la superficie S .

ÁREA DE UNA SUPERFICIE

Área de una superficie

Sea S la superficie definida por la parametrización $\bar{T}(u, v) = x(u, v)\bar{i} + y(u, v)\bar{j} + z(u, v)\bar{k}$ y sea D una región del plano uv en la cual x, y, z y sus derivadas parciales respecto de u y v están definidas y son continuas. El área de la superficie S está definida por

$$\text{área}(S) = \iint_S dS = \iint_D \|\bar{T}_u(u, v) \times \bar{T}_v(u, v)\| \, dudv$$

En el caso de que la superficie venga dada por $z = g(x, y)$, el área es

$$S = \iint_S dS = \iint_D \|\bar{T}_x \times \bar{T}_y\| \, dxdy = \iint_D \sqrt{1 + (g_x(x, y))^2 + (g_y(x, y))^2} \, dxdy$$