Sostenibilidad: Cambio y Vulnerabilidad

Ricardo Anadón
Catedrático de ECOLOGÍA

Los humanos utilizamos múltiples sustancias de la atmósfera, el agua y la superficie de la Tierra como recurso para nuestra actividad metabólica y para generar los útiles que usamos, la construcción de nuestros habitáculos y la obtención de energía para calentar y realizar trabajo.

Indirectamente el uso de los recursos es mas complejo, dado que aunque no los usemos directamente son necesarios para el desarrollo de especies y ecosistemas de los que dependemos

Recursos orgánicos

Especies que consumimos

Madera para construcción

Madera para combustible

Animales de transporte y compañía

Animales que polinizan

Ecosistemas que regulan

la concentración de gases atmosféricos
crecidas de ríos
formación de suelo
alimento para nuestros recursos
productos sanitarios
posibilidades de recreo

Recursos inorgánicos

Agua

Gases atmosféricos

Metales

Rocas y minerales

Suelo

Energía

Sales nutrientes

**¿Cuál es la disponibilidad y
tendencias de uso de
nuestros recursos?**

¿Que usan las Economías Industriales?

LOS CAMBIOS EN LA CUBIERTA VEGETAL (hace 8000 años)

LOS CAMBIOS EN LA CUBIERTA VEGETAL (en la actualidad)

La cubierta vegetal de la Tierra se ha modificado debido a la actividad humana. El cambio de usos de la Tierra, o la explotación excesiva de recursos en el Océano puede afectar a la Biodiversidad en el Planeta

El Cambio en el uso del suelo es una actividad que los humanos realizamos desde la antigüedad

Actualmente este proceso se está acelerando en algunos ecosistemas poco explotados, fundamentalmente las selvas ecuatoriales y tropicales

Canero Asturias

El cambio de uso puede ser agrícola y ganadero, industrial, residencial, de infraestructuras o de explotación

Crece la Población y Urbanizamos mucho territorio

Desarrollo de la superficie de invernaderos de plástico en Almería

- Cultivos muy rentables económicamente
- En el año 2005 había 52,000 Hectáreas de cultivos bajo plástico en la provincia de Almería

Nigel Burch, Curso de Profesores 2007

Mi experiencia laboral

- 3 años con casas de semillas holandesas
- Responsable de producción para una empresa agrícola con más de 500 Has de cultivos intensivos en Murcia, Alicante y Almería
- Cultivos intensivos bajo plástico en Almería

Nigel Burch, Curso de Profesores 2007

1993

Actualidad

Olloneg

El incremento de tierra agrícola necesita aportes energéticos importantes (Arabia Saudita)

La gestión agrícola se ha modificado incrementando el uso energético y el cambio de los paisajes

Photograph: Christoph Bürki Source (inset): REVUE 10/1990

Arable cropping in Switzerland comparing modern land management to that of around 1900 (inset).

Cultivo hidropónico de tomate

De 4 a 26 kg
por metro
cuadrado de
producción

- Control total
- Producciones muy altas
- Posibilidades de utilizar productos fitosanitarios por el riego
- Se resuelve el problema de una tierra "cansada"

Nigel Burch, Curso de Profesores 2007

Transformación en Ideología

- Gran monocultivo que necesita muchos recursos desde fuera y son poco estables
- Pequeños cultivos ecológicos ricos en diversidad que son estables.

Nigel Burch, Curso de Profesores 2007

Human coastal occupancy is significant in the European Atlantic Area

Distribución espacial de la PPN apropiada por las poblaciones humanas

Imhoff et al, Nature, 2004

Medida como *Human appropriation NPP a*, HANPP y *b*, HANPP como porcentaje de la NPP local. Ambos mapas usan estimas intermedias de HANPP; en unidades de carbono

El ambiente en la Tierra es muy Heterogéneo
como lo son los recursos

Los Biomas de la Tierra se relacionan con el clima y los suelos

Biomias Antropogénicos : mapa del mundo y áreas regionales. Los Biomias se organizan en grupos, y se eligen en orden de la densidad de la población

Ellis y Ramankkutti, 2007

Algunas de las alternativas no son tan maravillosas como muchas veces se presentan. La eficiencia de ahorro es baja, y pueden generar problemas en nuestro aprovisionamiento de alimentos

EL JUNGLE ROT de Guam (hongo *Trichoderma reesei*) ayuda a descomponer la celulosa en azúcares que destilan etanol con facilidad.

Biodiésel

La producción de biodiésel a partir de aceites vegetales requiere menos energía que la de biometanol a partir del maíz. Alemania, principal productor mundial, utiliza básicamente aceite de colza. En Estados Unidos, el biodiésel se extrae de los granos de soja (derochal).

ALEMANIA

■ PRODUCCIÓN EN ALEMANIA (a partir de la colza)

1.892 millones de litros (2006)

■ PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO EN ALEMANIA

(por litro, julio 2007)

■ BALANCE ENERGÉTICO

Energía procedente de combustibles fósiles utilizada para obtener el biodiésel (entrada) comparada con la energía que produce el biodiésel (salida).

■ EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

(producción y uso)

FUENTES: DOE, EUCOMBIPOD-INSTITUTE

Biocombustibles en España

Según el plan europeo global de la UE, en el año 2006 España debería haber introducido el 2% de biocarburantes en el mercado nacional de la gasolina y el gasóleo, pero en 2006 apenas alcanzamos el 0,53%. En nuestro territorio existen 15 plantas de producción de biodiésel y cuatro de biometanol.

ESPAÑA

■ CONSUMOS DE COMBUSTIBLES EN ESPAÑA (en 2006)

tep: toneladas equivalentes de petróleo

■ PORCENTAJE DE LA VENTA NACIONAL DE BIODIÉSEL Y BIOMETANOL PRODUCIDOS EN ESPAÑA (en términos energéticos, 2006)

Los gráficos no están a escala

FUENTES: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ENERGÍAS RENOVABLES (APRE); COMISIÓN DE REGULACIÓN ENERGÉTICA DE ESPAÑA (CRE); PRODUCTORES COREL, FORD, COMIS

An ethanol plant in Colorado, surrounded by fields of corn (maize).

Efectos ambientales de fuentes bioenergéticas.
(A) Reducción de GEI por ciclo completos de producción de biofuel para combustión; se representa la reducción relativa de emisiones respecto a los combustibles fósiles a los que los biocombustibles sustituyen. Tasa de aplicación de (B) fertilizantes y (C) pesticidas en valores medios de U.S. para maíz y soja. LIHD: Bajo Input Alta Diversidad

Limitaciones Ecológicas de la explotación Forestal en Canada

Limitaciones Ecológicas

- No o pocas
 - Moderadas
 - Severas
 - Sin bosque
 - Sin datos
-
- Zona de bosque comercial aproximada
 - Áreas Protegidas (reconocidas por World Wildlife Fund)
 - Agua

Mayores Compañías Madereras en Canada

Global Forest Watch

La obtención de maderas nobles o cambios de uso del suelo se han acelerado en países tropicales: el caso de Costa de Marfil

Bosques afectados de Africa

El cambio de uso de la tierra para nuevas plantaciones afectan a los ecosistemas y el paisaje

Photos: Anette Reenberg, GLP.

Emerging oil palm plantations in SE-Asia significantly change land use and impact the environment. This image shows a slope cleared for oil palm, *Elaeis guineensis*, plantations in Sarawak (Malaysia) and young oil palms ready for planting.

Brian Stokols

Emissions from boreal forest fires are a major source of carbon to the atmosphere

La destrucción de bosque emite grandes cantidades de dióxido de carbono, y destruye los ecosistemas, a veces de forma permanente a nuestra escala de tiempo

Photograph: M. Weiling

Smoke plume and pyrocumulus cloud over a deforestation fire in Rondonia, Brazil. Taken during the LBA-SMOCC field campaign in September 2002.

Figure 2. Croplands in the 20th Century.

20th Century Crop Cover

(Note: We aggregate the results in figure 1 into 16 major regions of the world. The results are presented as the fraction of cropland occupying the total land area of each region. As a percentage of total land area, the greatest cropland expansion occurred in South and Southeast Asia, while in absolute amounts, the greatest expansion occurred in the FSU and northern South America).

Ramankutty, et al, 2003

Ramankutty, et al, 2003

El incremento de energía parece necesario para elevar la cosecha

Fig. 7.2 Manpower input and yield per hectare for different corn production systems.

Fig. 7.4 Manpower input and yield per hectare for various rice production systems.

Gasto energético para diferentes métodos de explotación

Table 7.1 Energy Inputs and Outputs in Corn (Maize) Production in Mexico Using Only Manpower

	Quantity/ha	kcal/ha
INPUTS		
Labor	1,144 h ^a	624,000
Ax and hoe	16,570 kcal ^b	16,570
Seeds	10.4 kg ^b	36,608
Total		677,178
OUTPUTS		
Corn yield	1,944 kg ^a	6,901,200
kcal output/kcal input		10.19

^a Lewis, 1951.

^b Estimated.

Table 7.2 Energy Inputs for Corn Production in the United States

	Quantity/ha	kcal/ha
INPUTS		
Labor	10 h	5,000
Machinery	55 kg	1,018,000
Gasoline	40 L	400,000
Diesel	75 L	855,000
Irrigation	2.25 × 10 ⁶ kcal	2,250,000
Electricity	35 kwh	100,000
Nitrogen	152 kg	3,192,000
Phosphorus	75 kg	473,000
Potassium	96 kg	240,000
Lime	426 kg	134,000
Seeds	21 kg	520,000
Insecticides	3 kg	300,000
Herbicides	8 kg	800,000
Drying	3,300 kg	660,000
Transportation	300 kg	90,000
Total		11,037,000
OUTPUTS		
Total yield	7,000 kg	24,500,000
Kcal output/kcal input		2.22

Source: After Pimentel and Wen, 1988.

Pero no conviene olvidar que nuestras fuentes de proteína son variadas.
También existen alternativas de gestión que minimizan la pérdida de superficie fértil

Porcentaje de proteínas disponibles en el mundo para los hombres

Curso de Verano

Suelos Degradados Implica Menos Alimentos

EFECTOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO TEMPERATURA Y PLUVIOSIDAD

La modificación de las condiciones climáticas puede alterar la economía de países en vías de desarrollo, al afectar a sus principales exportaciones. El incremento de 2°C alterará la producción del principal producto de exportación de Uganda, el café.

Source: Otto Simonett, Potential impacts of global warming, GRID-Geneva, case studies on climatic change. Geneva, 1989.

El incremento de inundaciones, sequías y olas de calor puede provocar una reducción de la producción de alimentos

Imágenes del delta del Meckong y Hué (Viet Nam)

La pesquería mundial parece haber alcanzado su tope, y las pesquerías parecen haber llegado a su máxima explotación

Capturas Mundiales Marinas (millones toneladas) en las mayores áreas marinas pesqueras

Biomass of table fish in 1900 (Christensen *et al.* 2003, *Fish & Fisheries*)

and in 2000....

Watson and Pauly In: Atlas of the Ocean

Captures of bycatch equalise the commercial landings

The functioning of marine ecosystems are affected by landings and bycatch

The bycatch is a serious threat to sustainable strategies in fisheries

Louis Richardson drops shrimp in basket. Pile of dead fish, game species and all, will be dumped overboard.

Decreasing landings have economic and social cost for human coastal populations of the Atlantic Area

Source EU, 2006

Decreasing trend in fishing efficiency of lines in the last decades of past Century
 Some populations are at risk; drops in their abundance could affect the abundance of other harmful organisms as jellyfish

Catch per 100 hooks of Tuna and Sharks in the Atlantic Ocean

Myers y Worm (2003)

Anchovy in the Bay of Biscay

Spatial evolution of fishery

- Reduction of anchovy distribution in the North coast of the Iberian Peninsula
- Reduction of spring captures in the South
- Loss of fall landings in the South
- Development of fall fisheries in the North

IEO Report, 2006

Distribución de Manglares y cambio en Mesoamérica (Honduras),

National Geographic Feb 2007

Bosques tropicales: 30% del area original alterada por 2000 (Houghton 1995); tasa de perdida: 0,8% año⁻¹ (FAO 1997).

Arrecifes coralinos: 10% del area perdida, 30% degradada por mediados del siglo 21 (Wilkinson 1992).

Manglares: 34% pérdida desde 1980; perdida anual mundial: 2,2%, 3,8% en las Americas (Valiela et al. 2002).

EFFECTOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO NIVEL DEL MAR

Glaciar Uppsala, Cabo Hatteras USA, Tuvalu en el Pacífico, Monte Hood-Oregon

Photograph courtesy: US Geological Survey.

Extreme beach erosion occurred along California's coastlines during the 1997-98 El Niño season, causing millions of dollars in damage.

Coastal erosion in Pacifica, California is a pervasive problem that threatens many homeowners.

La erosión de costas es un peligro real ejemplo en costas de California e India

Photograph by: Lita Tinsler

Erosion on north coast of Chennai, India.

Figure 2: Sea Erosion at Shishmaref (June 2003)

A2 Scenario

Tourism Climate Index (TCI) (1961-1990)

Tourism Climate Index (TCI) (2071-2100)

Excellent

Very Good

Good

Acceptable

Unfavourable

PESETA project (UE)

Desarrollo Sostenible

Definición del PNUMA

Un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”

En un lenguaje más poético

Nuestros hijos nos han dejado prestado el planeta por toda nuestra vida

Definiciones del Diccionario de la Real Academia

Desarrollo: Acción o efecto de desarrollar

Desarrollar: Acrecentar , dar incremento a una cosa del orden físico, intelectual o moral

Sustentar: Conservar una cosa en su ser o estado

Sustentable: Que se puede sustentar o defender con razones

Sostener: Mantenerse un cuerpo en un medio o lugar, sin caer o haciéndolo muy lentamente

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD

- **Progreso social:** reconoce las necesidades de todos
- **Protección** efectiva del medioambiente
- **Prudente** uso de recursos
- Niveles altos y estables de **crecimiento económico** y de **empleo**

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD

- Vivir dentro de los **límites medioambientales**
- Asegurar una **sociedad** fuerte, justa y saludable
- Conseguir una **economía sostenible**
- Promover un **buen gobierno**
- Usar **estudios científicos** de forma responsable

El valor de los servicios de los ecosistemas y del capital natural también se modificarán. Se afectará la disponibilidad de agua, la distribución de especies (algunos recursos). Pero no conocemos cual será la intensidad de la modificación

Mapa global del valor de los servicios de los ecosistemas. En USD/Ha

Costanza et al, (1997)

1. **Provisioning Services (goods)** - fish and shellfish, genetical and medical resources, raw materials
2. **Regulating Services** - mitigation of eutrophication, coastal protection, pollution control, pest control, atmospheric gases ...
3. **Cultural Services** - aesthetic values, recreation, education, research, monitoring Global Change

A new vision of Sustainability

Biodiversity or Earth's life support systems are synonymous

Fischer et al., 2007

Nuestro reto es conciliar las tres patas de la sostenibilidad ambiental

1. ¿Cómo balancear estas tres patas cuando la presión humana presiona por la económica y la social?
2. ¿Cómo conciliar nuestra respuesta con la equidad con otros humanos?
3. ¿Cómo manejar los recursos agrícolas, pesqueros, energéticos y minerales en un ambiente y ecosistemas cambian?

SOSTENIBILIDAD

NUEVAS FORMAS DE ENTENDERLA

¿CUANTO PODEMOS TRANSFORMAR Y USAR?
¿CUÁL ES EL EFECTO ADITIVO O SINÉRGICO DE LAS ACCIONES?
¿CÓMO TRASPONER LAS IDEAS A LA ACCIÓN LOCAL?

Debemos Adaptar nuestra sociedad y economía a las condiciones ambientales nuevas y cambiantes

Cooperative and adaptative efforts to preserve Biodiversity and resources

Preservation and Exploitation must be considered two faces of the same problem

We must develop a new and integrated Knowledge

We must develop new Ideas and Technologies

Costanza and Jørgensen. *Understanding and solving Environmental Problems in the 21st century: Towards a New, Integrated Hard Problem Science*. Elsevier

Tenemos que pensar que
debemos hacer ahora
Para poder mantener la
vida de futuras generaciones

Desde una Gestión
Adaptativa y Responsable

Nuestros cerebros
típicamente
responden a las
incertidumbres
reduciendo
bruscamente la
importancia del
futuro en nuestra
toma de decisiones

*descuento
hiperbólico*

Hasta un **Incierto Futuro**
con muchos riesgos